

8. 乳癌

■EC療法

エピルビシン	90mg/m ²	Day1	
シクロホスファミド	600mg/m ²	Day1	
21日ごと			催吐リスク：高

■dose-dense EC療法

エピルビシン	90mg/m ²	Day1	
シクロホスファミド	600mg/m ²	Day1	
ペグフィルグラスチム	3.6mg 皮下注射	Day2 or 3	
14日ごと			催吐リスク：高

■FEC療法

フルオロウラシル	500mg/m ²	Day1	
エピルビシン	100mg/m ²	Day1	
シクロホスファミド	500mg/m ²	Day1	
21日ごと			催吐リスク：高

■weekly PTX療法

パクリタキセル	80mg/m ²	Day1	
7日ごと			催吐リスク：軽

■weekly PTX+BV療法

パクリタキセル	90mg/m ²	Day1、8、15	
ベバシズマブ	10mg/kg	Day1、15	
28日ごと			催吐リスク：軽

■DOC療法

ドセタキセル	60~70mg/m ²	Day1	
21日ごと			催吐リスク：軽

■dose-dense DOC療法

ドセタキセル	60~70mg/m ²	Day1
ペグフィルグラスチム	3.6mg 皮下注射	Day2 or 3
14日ごと		催吐リスク：軽

■ペムブロリズマブ+PTX療法

ペムブロリズマブ	200 or 400mg/body	Day1
パクリタキセル	90mg/m ²	Day1、8、15
ペムブロリズマブは21 or 42日ごと、パクリタキセルは28日ごと		催吐リスク：軽

■nab-PTX療法

パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	Day1
21日ごと		催吐リスク：軽

■S-1療法

S-1	1回 40mg/m ² 1日2回	Day1~28
42日ごと		催吐リスク：軽

■カペシタビン療法

カペシタビン	1回 1250mg/m ² 1日2回	Day1~14
21日ごと		催吐リスク：軽

■ERI療法

エリブリン	1.4mg/m ²	Day1、8
21日ごと		催吐リスク：軽

■GEM療法

ゲムシタビン	1250mg/m ²	Day1、8
21日ごと		催吐リスク：軽

■VNR療法

ビルルビン	25mg/m ²	Day1、8
21日ごと		催吐リスク：最小

■ weekly HER+PTX 療法

トラスツズマブ	初回:4mg/kg	2回目以降:2mg/kg	Day1	催吐リスク：軽
パクリタキセル	80mg/m ²		Day1	
7日ごと				

■ PER+HER+DOC 療法

ベルツズマブ	初回:840mg	2回目以降:420mg	Day1	催吐リスク：軽
トラスツズマブ	初回:8mg/kg	2回目以降:6mg/kg	Day1	
ドセタキセル	75mg/m ²		Day1	
21日ごと				

■ 3wHER+DOC 療法

トラスツズマブ	初回:8mg/kg	2回目以降:6mg/kg	Day1	催吐リスク：軽
ドセタキセル	70mg/m ²		Day1	
21日ごと				

■ 3wHER+TC 療法

トラスツズマブ	初回:8mg/kg	2回目以降:6mg/kg	Day1	催吐リスク：中
ドセタキセル	75mg/m ²		Day1	
シクロホスファミド	600mg/m ²		Day1	
21日ごと				

■ 3wHER 療法

トラスツズマブ	初回:8mg/kg	2回目以降:6mg/kg	Day1	催吐リスク：最小
21日ごと				

■ T-DM1 療法

トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg		Day1	催吐リスク：軽
21日ごと				

■ 3wHER+VNR 療法

トラスツズマブ	初回:8mg/kg	2回目以降:6mg/kg	Day1	催吐リスク：最小
ビニルルビン	25mg/m ²		Day1、8	
21日ごと				

■ T-DXd 療法

トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	Day1	
21 日ごと			催吐リスク：中

■ ラパチニブ+カペシタビン療法

ラパチニブ	1 回 1250mg	1 日 1 回	連日内服
カペシタビン	1 回 1000mg/m ²	1 日 2 回	Day1~14
21 日ごと			催吐リスク：軽

■ パルボシクリブ+内分泌療法

パルボシクリブ	1 回 125mg	1 日 1 回	Day1~21
内分泌療法剤を併用			
28 日ごと			催吐リスク：軽

■ アベマシクリブ+内分泌療法

アベマシクリブ	1 回 150mg	1 日 2 回	連日内服
内分泌療法剤を併用			催吐リスク：中

■ エベロリムス+内分泌療法

エベロリムス	1 回 10mg	1 日 1 回	連日内服
内分泌療法剤(エキセメスタン)を併用			催吐リスク：軽

■ ラパチニブ+内分泌療法

ラパチニブ	1 回 1500mg	1 日 1 回	連日内服
内分泌療法剤(アロマターゼ阻害剤)を併用			催吐リスク：軽